

Esercizi

4 - SOTTOSPAZI VETTORIALI, SISTEMI DI GENERATORI, DIPENDENZA LINEARE

Legenda:

- 😊 : Un gioco da ragazzi, dopo aver riletto gli appunti del corso
 😞 : Ci devo pensare un po', ma posso arrivarci
 🤖 : Non ci dormirò stanotte

😊 **Esercizio 1.** Stabilire quali dei seguenti sottoinsiemi è un sottospazio vettoriale del corrispondente spazio vettoriale V indicato. Giustificare la risposta.

- (a) $V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$.
 (b) $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(x, x + 3, z) : x, z \in \mathbb{R}\}$.
 (c) $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(x + 3, y, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$.
 (d) $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 3y + 4z = 0\}$.
 (e) $V = \mathbb{R}^4$, $W = \{(x, x, x, x) \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq 1\}$.
 (f) $V = \mathbb{R}^4$, $W = \mathbb{R}^4 \setminus \{(0, 0, 1, 0)\}$.
 (g) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = 0 \right\}$.
 (h) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R}, a + b = b + c = c + d = 0 \right\}$.

😊 **Esercizio 2.** Sia $V = \mathbb{R}^4$ e siano

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, -1, 0), \\ v_2 &= (0, 1, 2, -1), \\ v_3 &= (-2, 0, 0, 3), \\ v_4 &= (1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

- (a) Il vettore $v = (1, 0, 0, 0)$ è combinazione lineare di v_1, v_2, v_3 e v_4 ? In caso affermativo, determinare i coefficienti della combinazione lineare.
 (b) I vettori v_1, v_2, v_3 e v_4 sono linearmente indipendenti? Giustificare la risposta.
 (c) L'insieme $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ è un sistema di generatori di \mathbb{R}^4 ?

😊 **Esercizio 3.** Sia $V = \mathbb{R}[X]$ lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti in \mathbb{R} .

- (a) Mostrare che per ogni intero $n \geq 0$, $\mathbb{R}_{\leq n}[X] := \{P(X) \in \mathbb{R}[X] : \deg(P(X)) \leq n\}$ è uno sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[X]$.
 (b) Quali tra i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}_{\leq 3}[X]$ è un sottospazio vettoriale? Giustificare la risposta.
 - $U_1 = \{P(X) \in \mathbb{R}_{\leq 3}[X] : P(1) = 0\}$.


- $U_2 = \{P(X) \in \mathbb{R}_{\leq 4}[X] : P(X) = P(-X)\}$.
- (c) Siano $v_1 = X^3 + 4$, $v_2 = X^2 - 2X + 2$, $v_3 = X^2 - 3X + 8$, $v_4 = 3X^3 + 2X$ quattro vettori di $\mathbb{R}_{\leq 3}[X]$. Determinare se v_1, v_2, v_3 e v_4 sono linearmente indipendenti.
- (d) Siano v_1, v_2, v_3 e v_4 come al punto (c). È vero che $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle = \mathbb{R}_{\leq 3}[X]$? Giustificare la risposta.

 **Esercizio 4.** Sia $V = \mathbb{R}^3$ e siano $v_1 = (-1, 2, 4)$, $v_2 = (1, 6, 10)$.

- (a) Determinare per quali $h \in \mathbb{R}$ il vettore $(h, h + 1, h + 2) \in \langle v_1, v_2 \rangle$.
- (b) Mostrare che $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle (1, 2, 3), (3, -2, -5) \rangle$.

 **Esercizio 5.** Siano v_1, v_2, v_3 tre vettori linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale V su \mathbb{R} .

- (a) Mostrare che anche i vettori $v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3$ sono linearmente indipendenti.
- (b) Determinare i valori di $a \in \mathbb{R}$ per i quali i vettori $v_1 + av_2, v_2 + av_3, v_1 + av_3$ sono linearmente indipendenti.


 **Esercizio 6.** Sia V uno spazio vettoriale su K . Siano v_1, v_2, \dots, v_n vettori di V . Dimostrare le seguenti proposizioni:

- (a) I vettori v_1, v_2, \dots, v_n sono linearmente indipendenti se e solo se esiste $i \in \{1, \dots, n\}$ tale che v_i è combinazione lineare degli altri vettori.
- (b) Se l'insieme $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ contiene il vettore nullo, allora v_1, v_2, \dots, v_n sono linearmente dipendenti.
- (c) Se v_1, v_2, \dots, v_n sono linearmente indipendenti allora v_1, v_2, \dots, v_m sono linearmente indipendenti per ogni $1 \leq m < n$.
- (d) Se v_1, v_2, \dots, v_n sono linearmente indipendenti e $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in K$ sono tali che

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = \sum_{i=1}^n b_i v_i$$

allora $a_i = b_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

- (e) I vettori v_1, v_2, \dots, v_n sono linearmente indipendenti se e solo se $v_{i+1} \notin \langle v_1, \dots, v_i \rangle$ per ogni $i = 1, \dots, n - 1$.

 **Esercizio 7.** Sia $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- (a) Siano L e U i sottoinsiemi di V costituiti dalle matrici 2×2 rispettivamente triangolari inferiori e superiori. Mostrare che L e U sono due sottospazi vettoriali di V .
- (b) Descrivere il sottospazio intersezione $D := U \cap L$.
- (c) Determinare due sottospazi W_1 e W_2 di D tali che $D = W_1 \oplus W_2$.